



PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA
Y HEPATITIS VIRALES

PERFIL DE LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA




La salud... un derecho para vivir bien



Casos de VIH/SIDA, Bolivia, (1984 – Junio 2018)


Total: **22,311** casos (**17,626** vivos) Estimación ONUSIDA: **22.000** casos vivos



Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA-HV

Casos diagnosticados. Bolivia 2013- junio 2018

- ❑ Desde 1984 hasta Junio de 2018 se han diagnosticado 22,311 casos.
- ❑ Aproximadamente 17,600 se encontraban vivos a junio de 2018
- ❑ La proyección de ONUSIDA es de **22,000** casos vivos para la gestión 2018




A partir del año 2016 se esperaba un incremento de los casos diagnosticados con la ampliación de cobertura y la implementación del nuevo algoritmo diagnóstico.

Casos diagnosticados. Bolivia 1984- junio 2018


Situación al momento del Diagnóstico.

Tendencia


En total se diagnosticaron 22,311 casos



Antes de 2000
(n=495)




De 2000 a 2010
(n=5,694)




Después de 2010
(n=16,122)

Distribución de Casos VIH/SIDA por Departamento



- Casi la mitad de los casos en Santa Cruz; Scz, Cbba y Lpz: 86,2%; El resto del país: 13,8%
- La mayoría de los casos en las ciudades capitales y ciudades intermedias.
- Existen casos en áreas rurales y en población que pertenece a algún pueblo indígena, originario, campesino


Distribución proporcional de Casos VIH/SIDA diagnosticados por Departamento, según periodo.



Antes de 2010 más de la mitad de los casos eran diagnosticados en Santa Cruz.
De 2010 adelante se incrementa la proporción de casos diagnosticados en La Paz y en otros departamentos

Casos diagnosticados. Bolivia 1984-junio 2018


Grupo etario. Tendencia



La edad mediana va bajando.

La mitad de los casos diagnosticados después del 2010 tiene 28 años o menos.

Caracterización de la Epidemia: Vía de transmisión. Bolivia 1984-junio 2018




○ La Transmisión del VIH, en forma casi generalizada es por vía sexual.

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA


Casos diagnosticados. Bolivia 1984-junio 2018

Proporción de **GBT-HSH** entre los varones de 15 años y más. Tendencia


En total se diagnosticaron **14,712** varones de 15 años o más



Antes de 2000
(n=356)




De 2000 a 2010
(n=3,626)



Después de 2010
(n=10,730)


Número de PVV en TARGA. Bolivia 2013 - junio 2018



El incremento de las PVV que reciben TARGA es relativamente homogéneo en los últimos 5 años.


Para mas adelante se espera un mayor incremento por la implementación del «**Test and Treat**»

N° de Pruebas Rápidas de VIH realizadas a población GBT-HSH. Bolivia 2012-2017



El año 2017 se incrementó significativamente el número de PR-VIH realizadas a población GBT-HSH, tanto en establecimientos de salud como en sub receptores de sociedad civil.

N° de Pruebas Rápidas de VIH realizadas a Trabajadoras Sexuales. Bolivia 2012-2017



Los últimos 4 años, entre establecimientos de salud y subreceptores de sociedad civil realizaron alrededor de 18 mil PR-VIH a Trabajadoras sexuales.

Metas 90, 90, 90 (ONUSIDA)

90%

of all



De personas que viven con VIH conocen su diagnóstico.

90%

of all



De personas que viven con VIH reciben su terapia antirretroviral.

90%

of all




De personas con tratamiento ARV tienen carga viral suprimida.

Cuando una persona conoce su diagnóstico, reduce la posibilidad de transmisión.

Cascada del continuo de la atención en VIH.

Metas 90-90-90. Bolivia 2017





Gracias.....
